

Beispiele zur Bekämpfung von Flughafer, Hirse und Unkräutern in Mais 2016 ohne Terbutylazin

Mittel	l/kg/ha	€/ha ¹⁾	Abstand zu Gewässern/Hecken	Hang ⁴⁾ > 2%	H. Hirse	B. ⁶⁾ Hirse	Flug- ⁶⁾ hafer	Rispe	Gänse- fuß	Ka- mille	Klet- tenl.	Nacht- sch.	W. knöt.	Vo- gel- knöt.	Ehren- preis	Storch- schn.	Boden- feuchte- bedarf	Dauer- wirkung Hirse	Unkr.
Spectrum ⁷⁾ Maran+Kelvin+Bo 235 (Spectrum Komplett)	0,8 / 0,8 + 0,8 + 0,4	77	20(10/5/5)/ 20(20/20/0) ²⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	8	6	9	7	7	7	5
Spectrum ⁷⁾ Maran + Bo 235 (Spectrum Profi-Pack)	1,0 / 1,0 + 0,4	79	20(10/5/5)/ 20(20/20/0) ²⁾	5 m	9	7	3	7	9	9	9	9	8	6	9	7	7	7	5
Spectr. Aqua-Pack ⁷⁾ TASK + FHS	1,0 + 2,0 / 0,3 + 0,25	105	-(20/20/10) / 20(20/0/0) ³⁾	5 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7	7	9	7	7	7	5
Spectr. Aqua-Pack ⁷⁾ Samson 4 SC + Arrat + Dash	1,25+2,5 / 0,5 + 0,2 + 1,0	110	-(20/20/10) / 20(20/0/0) ³⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7	7	9	7	7	7	5
Spectr. Aqua-Pack ⁷⁾ Arigo + FHS	0,8 + 1,6 / 0,25+0,25	91	-(20/20/10) / 20(20/0/0) ³⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7	5	9	7	7	7	5
Quantum +Activus SC⁷⁾ TASK + FHS	1,5 + 2,0 / 0,3 + 0,25	111	-(20/15/10) / 20(20/0/0) ³⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	9	7	7	7	9	6	7	7	5
MaisTer power	1,5	58	10(5/0/0)/ 20(20/20/0) ²⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7	7	7	7	3	7	5
Dual Gold ⁷⁾ Elumis + Peak (Elumis P Dual Pack)	1,25 / 1,25+20 g	78	5(5/0/0)/ 20(20/20/0) ²⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	7	7	9	9	7	6	7	5	4
Dual Gold ⁷⁾ Elumis (Inno Protect Mais Duo)	1,25 / 1,25	74	5(5/0/0)/ 20(20/20/0) ²⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	7	7	6	6	7	6	7	5	4
Dual Gold + Arigo + FHS + B 235	1,25 + 0,3 / + 0,3+0,3	84	10(5/5/0)/ 20(20/0/0) ³⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7	5	9	6	5	5	3
Dual Gold + Laudis Express	1,25 / +2,0 + 0,4	89	5(5/5/0)/ 20(20/20/0) ²⁾	10 m	9	7	3	5	9	9	7	9	7	4	5	6	5	5	1
MaisTer flüssig + Sulcogan + B 235	1,25 / +1,0 + 0,5	87	10(5/5/0)/ 20(20/20/0) ²⁾	20 m	9	7	7	9	9	9	7	9	7	5	9	3	3	4	3
Elumis + Peak (Elumis P Pack)	1,25+20 g	63	5(5/0/0)/ 20(20/20/0) ²⁺⁵⁾	20 m	9	9	7	9	9	9	7	7	9	9	7	3	3	1	3

Die Einstufung erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Verhältnissen in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim

- | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 9 sehr gute | 7 gute | 5 befriedigende | 3 geringe | 1 keine Wirkung |
| 9 sehr hoher | 7 hoher | 5 mittlerer | 3 geringer | 1 kein Anspruch an die Bodenwirkung |
| 9 sehr lange | 7 lange | 5 mittlere | 3 geringe | 1 keine Dauerwirkung |

¹⁾ Preise für größere Gebinde 2016 ohne MwSt.

²⁾ In Gemeinden mit ausreichendem Anteil an Kleinstrukturen keine Einschränkung zu „Nichtzielflächen!“

³⁾ In Gemeinden ohne ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ist zu nicht gepflanzten Hecken ein zusätzlicher Abstand von 5 m unabhängig von der Düse erforderlich.

⁴⁾ Bei > 2 % Hangneigung ist zu Gewässern ein Randstreifen mit geschlossener Pflanzendecke erforderlich außer bei Mulch/Direktsaat

⁵⁾ Max. 45 g Nicosulfuron/ha und Jahr; Wirkstoff Nicosulfuron nur jedes 2. Jahr auf derselben Fläche einsetzbar!

⁶⁾ Ab Bestockungsbeginn: 1,0 l/ha Samson 4 SC/Nicogan oder 330 g/ha Arigo oder 40 g/ha Cato

⁷⁾ **Achtung Spritzfolge**, da Spectrum, Dual Gold und Quantum gegen Storchschnabel sehr früh im Voraufbau eingesetzt werden müssen!

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg
Fachzentrum Pflanzenbau, Stand: 04.2016