

Beispiele zur Bekämpfung von Flughafer, Hirse und Unkräutern in Mais 2010 ohne Terbutylazin

Mittel	l/kg/ha	€/ha ¹	Abstand zu Gewässern/Hecken	Hang ⁴⁾ > 2%	H. Hirse	B. ⁸⁾ Hirse	Flug- ⁸⁾ h.	Rispe	Gänsefuß	Ka-mille	Klet-tenl.	Nacht-sch.	W. knöt.	Vo-gel-knöt.	Stief-m.	Storch-schn.	Boden-feuchte-bedarf	Dauer-wirkung Hirse	Unkr.
Milagro forte Peak P. + Callisto	0,72 + 20g + 0,75	76	5(5/0/0)/20(20/20/0) ₂₎₊₅₎	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7-9	7	9	3	3	1	3
Dual Gold + Milagro forte Peak P. + Callisto	1,0 + 0,72+20 g + 0,75	97	5(5/0/0)/20(20/20/0) ₂₎₊₅₎	20 m	9	9	7	9	9	9	9	9	7-9	7	9	5-7	5	5-7	3-5
Clio Star + Spectrum + Motivell	1,0 + 1,0 + 0,75	91	20(10/5/5)/20(0/0/0) ₂₎₊₅₎₊₆₎	0 m	9	9	7	9	9	9	9	9	5-7	5-7	7	7	5	7	5
Clio Star + Motivell + Certrol B	0,8 + 0,8 + 0,5	67	15(5/5/0)/20(20/0/0) ₂₎₊₅₎₊₆₎	5 m	9	9	7	9	9	9	9	9	9	5-7	7	3	3	3-5	3
Clio Star + Motivell	1,0 + 1,0	73	5(0/0/0)/20(0/0/0) ₂₎₊₅₎₊₆₎	0 m	9	9	7	9	7	9	9	9	5-7	5-7	7	3	3	3-5	3
Task + FHS + Terano	255 g + 0,2 + 0,75	82	10(5/5/0)/20(20/20/0) ³⁾	20 m	7	7	7	9	9	9	9	9	5-7	5	9	5	7	5	7
Motivell + Callisto	0,75 + 0,75	63	5(0/0/0)/20(20/20/0) ₂₎₊₅₎	0 m	9	9	7	9	7-9	9	9	9	5	3	9	3	3	1	3
Clio Star + Spectrum + Certrol B	1,0 + 1,0 + 0,4	72	15(5/5/0)/20(20/0/0) ₂₎₊₆₎	5 m	9	9	1	9	9	7-9	9	9	9	5-7	3	7	7	7	5
Clio Star + Spectrum	1,0 + 1,0	65	20(10/5/5)/20(20/0/0) ₂₎₊₆₎	0 m	9	9	1	7	9	5	7	9	5	5	3	7	7	7	5
Dual Gold + Callisto + Certrol B	1,0 + 1,0 + 0,3	78	15(5/5/0)/20(20/20/0) ²⁾	10 m	9	5 ⁷⁾	1	5	9	9	9	9	5-7	5	9	5-7	5	5	3
Mirano Komplet (Mikado+Terano+Buct.)	1,0 + 0,8 + 0,3	74	15(5/5/0)/20(20/20/0) ²⁾	20 m	7	5	1	9	7-9	9	9	9	5-7	5	5-7	5	7	5	7
Laudis Express (Laudis + Bucril)	1,5 + 0,5	45	15(10/5/5)/20(20/20/0) ³⁾	10 m	7	7	1	1	7-9	9	9	7	7	3	7	3	1	1	1

Die Einstufung erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Verhältnissen in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim

- | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 9 sehr gute | 7 gute | 5 befriedigende | 3 geringe | 1 keine Wirkung |
| 9 sehr hoher | 7 hoher | 5 mittlerer | 3 geringer | 1 kein Anspruch an die Bodenwirkung |
| 9 sehr lange | 7 lange | 5 mittlere | 3 geringe | 1 keine Dauerwirkung |

¹⁾ Preise für größere Gebinde 2009 ohne MwSt.

²⁾ In Gemeinden mit ausreichendem Anteil an Kleinstrukturen keine Einschränkung zu „Nichtzielflächen!“

³⁾ In Gemeinden ohne ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ist zu nicht gepflanzten Hecken ein zusätzlicher Abstand von 5 m unabhängig von der Düse erforderlich.

⁴⁾ Bei > 2 % Hangneigung ist zu Gewässern ein Randstreifen mit geschlossener Pflanzendecke erforderlich außer bei Mulch/Direktsaat

⁵⁾ Max. 45 g Nicosulfuron/ha + Jahr; Wirkstoff Nicosulfuron nur jedes 2. Jahr auf derselben Fläche einsetzbar!

⁶⁾ Keine zusätzliche Anwendung von Topramezone im selben Jahr!

⁷⁾ Ab 3-Blattstadium fällt Wirkung ab

⁸⁾ Ab Bestockungsbeginn: 1,0 l/ha Motivell/Milagro oder 40 g/ha Cato oder 306 g/ha Task

Stand: 10.02.2010